



## Prévenez votre médecin

- Devant une éruption cutanée : en principe, celle-ci régresse spontanément, mais elle peut parfois s'aggraver.
- Si vous avez des selles pâles ou grasses, douleurs abdominales ou à l'estomac, perte d'appétit, urine foncée, jaunissement de la peau : ce peut être des signes de problèmes hépatiques.

**APTIVUS® ne guérit pas de l'infection par le VIH  
ni du sida.**

**Sous ce traitement, le risque de transmission du virus VIH  
par contacts sexuels ou par contamination sanguine  
persiste.**

**Les précautions adaptées doivent être prises.**

*Ce document a été réalisé par des médecins et des pharmaciens du CHU de Clermont-Ferrand . Il répond à l'obligation d'information des patients (art. L5126-5 et R 5015-48 du Code de la Santé Publique) et ne cherche pas à remplacer les documents officiels pouvant être fournis par les laboratoires*

Rétrocessions Service Pharmacie - Pr. Chopineau - Hôpital Gabriel Montpied -  
CHU Clermont-Ferrand  
Téléphones : 04 73 75 17 68 (préparateurs) ou 04 73 75 17 67 (pharmaciens)



Vous prenez un traitement appelé **APTIVUS®**

Il est composé d'une molécule : **le tipranavir.**

Ce médicament est indiqué dans le traitement de l'infection  
par le VIH



A conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C).  
Conservation en cours d'utilisation : 60 jours (à une température ne dépassant pas 25 °C) après la première ouverture du flacon. Il est conseillé au patient d'inscrire la date d'ouverture du flacon sur l'étiquette et/ou sur la boîte

Il est conseillé au patient d'inscrire la date d'ouverture du flacon sur l'étiquette et/ou sur la boîte



### **Modalités de prise :**



Vous allez prendre ... comprimés de **APTIVUS®**, .....  
Ils doivent toujours pris pendant les repas, en 2 prises quotidiennes.  
Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau,  
il ne faut pas les écraser ou les croquer.

**Votre traitement ne doit jamais être arrêté, au risque d'entraîner des infections potentiellement graves, ainsi que des résistances du virus.**



En cas d'oubli: Si vous avez oublié de prendre votre traitement depuis moins de 4h, vous pouvez prendre le ou les comprimé(s) oublié(s). Si cela fait plus de 4h, attendre la prochaine prise.  
Ne jamais doubler la dose.



### **Adaptation posologique/ Interactions médicamenteuses :**

**Attention:** APTIVUS® peut être à l'origine d'interactions médicamenteuses: des adaptations de posologies sont parfois nécessaires, et certains médicaments sont interdits:

**Avant de prendre tout autre médicament, demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.**

Attention ne pas associer à des préparations à base de millepertuis.  
Eviter en général les gélules à base de plantes.



### **Effets indésirables possibles :**

- Nausées, vomissements, diarrhées
- Sensation de fatigue, maux de tête
- démangeaisons
- Allergies
- Elévations des transaminases...

Certains effets indésirables peuvent s'atténuer avec le temps :  
parlez en avec votre médecin ou à votre pharmacien.