



Modalités de prise :

Vous allez prendre ... comprimés d' **ATRIPLA®**,
Il vaut mieux les prendre en dehors des repas, et au coucher, pour diminuer l'impact des effets secondaires neurologiques.



Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau, il ne faut pas les ouvrir.

Votre traitement ne doit jamais être arrêté, au risque d'entraîner des infections potentiellement graves, ainsi que des résistances du virus.



En cas d'oubli: Si vous avez oublié de prendre votre traitement depuis moins de 12h, vous pouvez prendre le ou les gélule(s) oubliée(s). Si cela fait plus de 12h, attendre la prochaine prise.
Ne jamais doubler la dose.



Adaptation posologique/ Interactions médicamenteuses :

Attention: des adaptations de posologies sont parfois nécessaires avec ATRIPLA®, en particulier lors d'atteinte rénale.
Le ténofovir, une des molécules contenue dans ATRIPLA®, est toxique pour le rein : il faut donc éviter les médicaments tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui peuvent léser vos reins.
Exemples : → Ibuprofène (ADVIL®, NUREFLEX®, NUROFEN®...)
→ Diclofenac (VOLTARENE®, FLECTOR®...)
→ Kétoprofène (BI-PROFENID®, KETUM®...)

→ **Avant de prendre tout autre médicament, demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.**
Attention ne pas associer à des préparations à base de millepertuis.
Eviter en général les gélules à base de plantes.



Effets indésirables possibles :

- Anorexie
- Cauchemars, dépression, anxiété, troubles du sommeil
- Vertiges
- Somnolence, maux de tête
- Nausées, vomissements, diarrhées
- Rashes, sueurs nocturnes
- Fatigue ou augmentation de l'énergie
- Modification de la répartition des graisses (lipodystrophies)



Prévenez votre médecin

- Devant une éruption cutanée : en principe, celle-ci régresse spontanément, mais elle peut parfois s'aggraver.
- Si vous vous sentez déprimé, si vous avez des idées suicidaires : c'est un effet indésirable connu avec l'efavirenz, une molécule d'ATRIPLA®
- Devant une respiration profonde et rapide, une somnolence, des nausées et des douleurs d'estomac : ce peut être des signes d'acidose lactique, qui peut se produire avec l'emtricitabine, un des composants d'ATRIPLA®.
- Si vous ressentez des difficultés à bouger, une raideur et des douleurs des articulations : ce peut être des signes d'ostéonécrose, qui peut arriver lors d'un traitement avec association d'antirétroviraux.

ATRIPLA® ne guérit pas de l'infection par le VIH ni du sida.

Sous ce traitement, le risque de transmission du virus VIH par contacts sexuels ou par contamination sanguine persiste.

Les précautions adaptées doivent être prises

Ce document a été réalisé par des pharmaciens et des médecins du CHU de Clermont-Ferrand. Il répond à l'obligation d'information des patients (art. L5126-5 et R 5015-48 du Code de la Santé Publique) et ne cherche pas à remplacer les documents officiels pouvant être fournis par les laboratoires

Rétrocessions Service Pharmacie - Pr. Chopineau - Hôpital Gabriel Montpied -
CHU Clermont-Ferrand
Téléphones : 04 73 75 17 68 (préparateurs) ou 04 73 75 17 67 (pharmaciens)



Vous prenez un traitement appelé **ATRIPLA®**
Il est composé de 3 molécules : **l'emtricitabine,**
l'efavirenz et le ténofovir.

Ce médicament est indiqué dans le traitement de
l'infection par le VIH



Conservation à température
ambiante, à l'abri de
l'humidité

