



Modalités de prise :



Vous allez prendre ... comprimés d' **EPIVIR®**,

Ils peuvent être pris pendant ou en dehors des repas.
Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau,
il est possible de les écraser et de les mélanger avec de la nourriture.

Votre traitement ne doit jamais être arrêté, au risque d'entraîner des infections potentiellement graves, ainsi que des résistances du virus.



En cas d'oubli: Si vous avez oublié de prendre votre traitement depuis moins de 4h, vous pouvez prendre le ou les comprimé(s) oublié(s). Si cela fait plus de 4h, attendre la prochaine prise.
Ne jamais doubler la dose.



Adaptation posologique/ Interactions médicamenteuses :

Attention: EPIVIR® peut être à l'origine d'interactions médicamenteuses: des adaptations de posologies sont parfois nécessaires, et certains médicaments sont interdits:

Avant de prendre tout autre médicament, demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.
Attention ne pas associer à des préparations à base de millepertuis.
Eviter en général les gélules à base de plantes.



Effets indésirables possibles :

- Maux de tête, insomnie, fatigue
- Anémie (fatigue, essoufflement, palpitations)
- Nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales
- Perte des poils et/ou des cheveux
- Douleurs musculaires et/ou articulaires
- Redistribution des graisses (lipodystrophies)



Prévenez votre médecin

- Si vous ressentez des difficultés respiratoires, une somnolence, des nausées, des vomissements
→ ce peut être le début d'une acidose lactique ou une pancréatite.
- Si vous ressentez des douleurs articulaires et des difficultés à vous mouvoir :
- → ces effets peuvent être le début de troubles osseux.

EPIVIR® ne guérit pas de l'infection par le VIH ni du sida. Sous ce traitement, le risque de transmission du virus VIH par contacts sexuels ou par contamination sanguine persiste. Les précautions adaptées doivent être prises.

Ce document a été réalisé par des pharmaciens et médecins des du CHU de Clermont-Ferrand . Il répond à l'obligation d'information des patients (art. L5126-5 et R 5015-48 du Code de la Santé Publique) et ne cherche pas à remplacer les documents officiels pouvant être fournis par les laboratoires

Rétrocessions Service Pharmacie - Pr. Chopineau - Hôpital Gabriel Montpied -
CHU Clermont-Ferrand
Téléphones : 04 73 75 17 68 (préparateurs) ou 04 73 75 17 67 (pharmaciens)



Vous prenez un traitement appelé **EPIVIR®**
Il est composé d'une molécule : **la lamivudine.**
Ce médicament est indiqué dans le traitement de
l'infection par le VIH



Conservation à température
ambiante, à l'abri de
l'humidité

