



Modalités de prise :



Vous allez prendre ... comprimés d' **INTELENCE®**,
Ils doivent être pris après les repas, car à jeun, seule la moitié de la dose est absorbée.

Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau. il est possible de les dissoudre dans l'eau. Il faut bien mélanger la suspension et la boire immédiatement. Le verre doit être bien rincé avec de l'eau à plusieurs reprises et chaque eau de rinçage doit être complètement avalée pour que la totalité de la dose soit prise.

Votre traitement ne doit jamais être arrêté, au risque d'entraîner des infections potentiellement graves, ainsi que des résistances du virus.



En cas d'oubli: Si vous avez oublié de prendre votre traitement depuis moins de 6h, vous pouvez prendre le ou les comprimé(s) oublié(s). Si cela fait plus de 6h, attendre la prochaine prise. Ne jamais doubler la dose.



Adaptation posologique/ Interactions médicamenteuses :

Attention: INTELENCE® peut être à l'origine d'interactions médicamenteuses: des adaptations de posologies sont parfois nécessaires, et certains médicaments sont interdits:

Avant de prendre tout autre médicament, demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.
Attention ne pas associer à des préparations à base de millepertuis.
Eviter en général les gélules à base de plantes.



Effets indésirables possibles :

- Eruptions cutanées
- Nausées, vomissements, diarrhées
- Fatigue
- Neuropathie périphérique, maux de tête
- Modification de la répartition des graisses (lipodystrophie)

Certains effets indésirables peuvent être traités ou s'atténuer avec le temps : parlez-en à votre médecin et à votre pharmacien.



Prévenez votre médecin

- Devant une éruption cutanée ; elle survient généralement en début de traitement, et cède spontanément 1 à 2 semaines après, mais elle peut aussi s'aggraver.
- Devant une raideur et des douleurs des articulations.
→ ce peut être un signe d'atteinte osseuse.

INTELENCE® ne guérit pas de l'infection par le VIH ni du sida.

Sous ce traitement, le risque de transmission du virus VIH par contacts sexuels ou par contamination sanguine persiste.

Les précautions adaptées doivent être prises.

Ce document a été réalisé par des pharmaciens et des médecins du CHU de Clermont-Ferrand . Il répond à l'obligation d'information des patients (art. L5126-5 et R 5015-48 du Code de la Santé Publique) et ne cherche pas à remplacer les documents officiels pouvant être fournis par les laboratoires

Rétrocessions Service Pharmacie - Pr. Chopineau - Hôpital Gabriel Montpied -
CHU Clermont-Ferrand
Téléphones : 04 73 75 17 68 (préparateurs) ou 04 73 75 17 67 (pharmaciens)



Vous prenez un traitement appelé **INTELENCE®**

Il est composé d'une molécule : **l'etravirine.**

Ce médicament est indiqué dans le traitement de
l'infection par le VIH



Conservation à température
ambiante, à l'abri de
l'humidité

