



Prévenez votre médecin

- Si vous souffrez de diarrhées, diabète, maladies du foie ou des reins, ou d'allergies.
- L'administration de ce médicament est à discuter en cas de grossesse.

**INVIRASE® ne guérit pas de l'infection par le VIH ni du sida.
Sous ce traitement, le risque de transmission du virus VIH par
contacts sexuels ou par contamination sanguine persiste.
Les précautions adaptées doivent être prises**

Ce document a été réalisé par des médecins et des pharmaciens du CHU de Clermont-Ferrand . Il répond à l'obligation d'information des patients (art. L5126-5 et R 5015-48 du Code de la Santé Publique) et ne cherche pas à remplacer les documents officiels pouvant être fournis par les laboratoires

Rétrocessions Service Pharmacie - Pr. Chopineau - Hôpital Gabriel Montpied -
CHU Clermont-Ferrand
Téléphones : 04 73 75 17 68 (préparateurs) ou 04 73 75 17 67 (pharmaciens)



Vous prenez un traitement appelé **INVIRASE®**

Il est composé d'une molécule : **le saquinavir**

Ce médicament est indiqué dans le traitement de l'infection
par le VIH



Conservation à température
ambiante, à l'abri de
l'humidité





Modalités de prise :

Vous allez prendre ... comprimés d' **INVIRASE®**,
Il vaut mieux les prendre dans les 2 heures suivant le repas.
le jus de pamplemousse est favorable car il augmente le taux d'INVIRASE disponible pour l'organisme



Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau, il ne faut pas les ouvrir.

Votre traitement ne doit jamais être arrêté, au risque d'entraîner des infections potentiellement graves, ainsi que des résistances du virus.



En cas d'oubli: Vous devez prendre la dose avec des aliments dès que vous vous apercevez de l'oubli, puis continuez de prendre le traitement normalement selon la prescription du médecin.
Ne jamais doubler la dose.



Adaptation posologique/ Interactions médicamenteuses :

Attention: des adaptations de posologies sont parfois nécessaires avec INVIRASE®, et certains médicaments sont contre indiqués.

→ **Avant de prendre tout autre médicament, demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.**
Attention ne pas associer à des préparations à base de millepertuis.
Eviter en général les gélules à base de plantes.



Effets indésirables possibles :

- Maux de tête
- Nausées, diarrhées, vomissements
- Gênes abdominales
- Atteintes au niveau de la bouche
- Réactions au niveau de la peau
- Redistribution des graisses, engourdissement (à long terme)

Certains effets indésirables peuvent s'atténuer avec le temps :
parlez en avec votre médecin ou à votre pharmacien.