



Modalités de prise :



Vous allez prendre ... comprimés de **KALETRA®**,
Ils doivent être pris pendant ou en dehors des repas.

Les comprimés doivent être avalés entiers avec un grand verre d'eau, il ne faut pas les écraser, les couper ou les croquer.

Votre traitement ne doit jamais être arrêté, au risque d'entraîner des infections potentiellement graves, ainsi que des résistances du virus.



En cas d'oubli: Si vous avez oublié de prendre votre traitement depuis moins de 6h, vous pouvez prendre le ou les comprimé(s) oublié(s). Si cela fait plus de 6h, attendre la prochaine prise. Ne jamais doubler la dose.



Adaptation posologique/ Interactions médicamenteuses :

Attention: KALETRA® peut être à l'origine d'interactions médicamenteuses: des adaptations de posologies sont parfois nécessaires, et certains médicaments sont interdits:

Avant de prendre tout autre médicament, demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.
Attention ne pas associer à des préparations à base de millepertuis.
Eviter en général les gélules à base de plantes.



Effets indésirables possibles :

- Maux de tête, nausées, troubles cutanés peuvent survenir en début de traitement, et s'atténuer spontanément par la suite.
- Troubles hépatiques
- Diarrhées
- Troubles du sommeil, fatigue
- Perturbation des bilans biologiques (augmentation des sucres et des graisses dans le sang)
- Modification de la répartition des graisses (lipodystrophies)

Certains effets indésirables peuvent être traités ou s'atténuer avec le temps : parlez-en à votre médecin et à votre pharmacien.



Prévenez votre médecin

- Une douleur musculaire inexplicquée, une sensibilité ou une faiblesse musculaire
- Jaunissement de la peau et du blanc des yeux, urines foncées, selles décolorées, fatigue → atteinte hépatique
- Soif, émission fréquente d'urine, vision trouble ou perte de poids
→ Augmentation du taux de sucre dans le sang : risque de diabète
- Nausées, vomissements, maux de ventre
→ Augmentation des corps gras dans le sang

KALETRA® ne guérit pas de l'infection par le VIH ni du sida.

Sous ce traitement, le risque de transmission du virus VIH par contacts sexuels ou par contamination sanguine persiste.

Les précautions adaptées doivent être prises.

Ce document a été réalisé par des pharmaciens et des médecins du CHU de Clermont-Ferrand . Il répond à l'obligation d'information des patients (art. L5126-5 et R 5015-48 du Code de la Santé Publique) et ne cherche pas à remplacer les documents officiels pouvant être fournis par les laboratoires

Rétrocessions Service Pharmacie - Pr. Chopineau - Hôpital Gabriel Montpied -
CHU Clermont-Ferrand
Téléphones : 04 73 75 17 68 (préparateurs) ou 04 73 75 17 67 (pharmaciens)



Vous prenez un traitement appelé **KALETRA®**
Il est composé de 2 molécules : le ritonavir et le lopinavir.

Ce médicament est indiqué dans le traitement de l'infection par le VIH



Conservation à température ambiante, à l'abri de l'humidité

