



Modalités de prise :



Vous allez prendre ... comprimés de **KIVEXA®**,
Ils doivent être pris pendant ou en dehors des repas.

Les comprimés doivent être avalés entiers avec un grand verre d'eau, il ne faut pas les écraser, les couper ou les croquer.

Votre traitement ne doit jamais être arrêté, au risque d'entraîner des infections potentiellement graves, ainsi que des résistances du virus.



En cas d'oubli: Si vous avez oublié de prendre votre traitement depuis moins de 4h, vous pouvez prendre le ou les comprimé(s) oublié(s). Si cela fait plus de 4h, attendre la prochaine prise. Ne jamais doubler la dose.



Adaptation posologique/ Interactions médicamenteuses :

Attention: KIVEXA® peut être à l'origine d'interactions médicamenteuses: des adaptations de posologies sont parfois nécessaires, et certains médicaments sont interdits:

Avant de prendre tout autre médicament, demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Attention ne pas associer à des préparations à base de millepertuis. Eviter en général les gélules à base de plantes.



Effets indésirables possibles :

- Réaction allergique
- Eruption cutanée
- Nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales
- Dyspnée, toux
- Fièvre, fatigue, malaise, douleurs musculaires
- Maux de tête
- Troubles du bilan hépatique
- Modification de la répartition des graisses (lipodystrophie)

Certains effets indésirables peuvent être traités ou s'atténuer avec le temps : parlez-en à votre médecin et à votre pharmacien.



Prévenez votre médecin

- Si vous présentez une éruption cutanée, ou des symptômes tels qu'une fièvre, un essoufflement, des maux de gorge, des nausées, vomissements ou douleurs abdominales, ainsi qu'une sensation de malaise général : ce peut être une réaction allergique, due à l'abacavir, un des composants du Kivexa®.
- Raideur, douleur et endolorissement d'articulations et difficultés à se déplacer → Signes d'une atteinte osseuse

KIVEXA® ne guérit pas de l'infection par le VIH ni du sida.

Sous ce traitement, le risque de transmission du virus VIH par contacts sexuels ou par contamination sanguine persiste.

Les précautions adaptées doivent être prises.

Ce document a été réalisé par des pharmaciens et des médecins du CHU de Clermont-Ferrand . Il répond à l'obligation d'information des patients (art. L5126-5 et R 5015-48 du Code de la Santé Publique) et ne cherche pas à remplacer les documents officiels pouvant être fournis par les laboratoires

Rétrocessions Service Pharmacie - Pr. Chopineau - Hôpital Gabriel Montpied -
CHU Clermont-Ferrand
Téléphones : 04 73 75 17 68 (préparateurs) ou 04 73 75 17 67 (pharmaciens)



Vous prenez un traitement appelé **KIVEXA®**
Il est composé de 2 molécules : l'abacavir et la
lamivudine.
Ce médicament est indiqué dans le traitement de
l'infection par le VIH



Conservation à température
ambiante, à l'abri de
l'humidité

