

SPECIALITE Coût / Jour	Molécule Présentations	Modalités de prise journalière	Principaux effets secondaires	Principaux éléments à surveiller
Inhibiteurs de protéase (IP) Attention aux interactions médicamenteuses				
INVIRASE® 13 €	SQV (Saquinavir) Gélule 200 mg, Comprimé 500 mg	2-0-2 (500 mg) + RTV (1-0-1) Au cours repas, ou 2H après.	Troubles digestifs Céphalées Troubles métaboliques Lipodystrophies	Glycémie, Bilan hépatique Bilan lipidique
NORVIR® 1 à 4 €	RTV (Ritonavir) Comprimé 100 mg Solution buvable 80mg/ml	1 à 4 cps / j selon l'IP boosté Au cours d'un repas.	Troubles digestifs Paresthésies Altération du goût Troubles métaboliques Lipodystrophies	Glycémie Bilan hépatique Bilan lipidique
CRIVAN® 11 €	IDV (Indinavir) Gélule 100, 200, 400 mg	+ RTV 1-0-1 Sans prise alimentaire mais hydratation ++ (1,5L d'eau/j)	Lithiases rénales Ictère par anémie hémolytique Sécheresse de la peau Troubles digestifs Troubles métaboliques Lipodystrophies	Glycémie Bilan hépatique Bilan lipidique Créatininémie et clearance Protéinurie Bilirubine
TELZIR® 14 €	FPV (Fosamprenavir) Comprimé 700 mg Suspension buvable 50 mg/ml	1-0-1 + RTV (1-0-1) Sans contrainte alimentaire (sauf susp. buv. en dehors des repas)	Troubles digestifs Rash cutané, Paresthésies péribucales Troubles métaboliques Lipodystrophies	Glycémie Bilan hépatique Bilan lipidique
KALETRA® 17 €	LPV / RTV (Lopinavir/ Ritonavir) Cp100/25,200/50 mg Solution buvable 80mg/20mg/ml	4 cp/jour en mono ou biprise. Au cours du repas.	Troubles digestifs Céphalées Somnolence Fatigue Troubles métaboliques Lipodystrophies	Glycémie, Bilan hépatique Bilan lipidique Lipasémie
REYATAZ® 16 €	ATV (Atazanavir) Gélule 150,200, 300 mg	1 gel 300mg +1 RTV 2 gel 200mg +1 RTV si EFV associé En monoprise au cours du repas.	Ictère Troubles digestifs Céphalées, insomnie Rash cutané, Troubles métaboliques BAV à fortes doses	Glycémie Bilan hépatique Bilan lipidique, Bilirubine CK Lipasémie
APTIVUS® 26 €	TPV (Tipranavir) Capsule 250 mg	Conserv. 2 à 8°C 2-0-2 + RTV (2-0-2) Au cours du repas.	Troubles digestifs Eruption cutanée Troubles hépatiques Troubles métaboliques Lipodystrophies	Glycémie Bilan hépatique Bilan lipidique
PREZISTA® 8 à 12 €	DRV (Darunavir) Comprimé 300, 400, 600 mg	Naïfs : 2-0-0 (400mg) + RTV 1-0-0 Prétraités 1-0-1 (600 mg) + RTV 1-0-1 Au cours du repas.	Troubles digestifs Rash cutané Troubles métaboliques Lipodystrophies	Glycémie Bilan lipidique Bilan hépatique Lipasémie

MODALITES DE PRISE ET DE SUIVI
DES TRAITEMENTS ANTIRETROVIRAUX

SPECIALITE Coût / Jour	Molécule Présentations	Modalités de prise journalière	Principaux effets secondaires	Principaux éléments à surveiller
Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)				
VIRAMUNE® 9.50 €	NVP (Névirapine) Comprimé 200 mg Suspension buvable 50mg/ml	1 cp/j les 15 premiers jours, puis 2 cp/j en mono ou biprise, Sans contrainte alimentaire.	Rashes cutanés (y-compris Steven Johnson) Anomalies hépatiques (y - compris hépatite fulminante fatale)	Surveiller l'état cutané Bilan hépatique Arrêt si intolérance
SUSTIVA® 11 €	EFV (Efavirenz) Gélule 50, 100, 200 mg Comprimé 600 mg Solution buvable 30mg/ml	600 mg/jour en monoprise Au coucher (à jeun).	Sensations vertigineuses, insomnie, troubles de concentration, perturbation des rêves/Réactions psychotiques/dépression aigue. Eruptions cutanées Anomalies hépatiques	Bilan hépatique Glycémie, Bilan lipidique
INTELENCE® 13 €	ETV (Etravirine) Comprimé 100 mg	2-0-2 Après le repas.	Rashes cutanés Troubles digestifs	NFS Glycémie Lipasémie Bilan hépatique Bilan lipidique
Inhibiteurs nucléotidiques de la reverse transcriptase				
VIREAD® 12.50 €	TDF (Ténofovir) Comprimé 300 mg	1 cp/j Au cours d'un repas.	Troubles digestifs Hypophosphatémie Tubulopathie proximale Néphrotoxicité	Créatininémie Phosphatémie Protéinurie Glycosurie
TRUVADA® 18 €	TDF + FTC Comprimé 300/ 200 mg	1 cp/j Au cours d'un repas.	Cf. VIREAD / EMTRIVA	Cf. VIREAD / EMTRIVA

SPECIALITE Coût / Jour	Molécule Présentations	Modalités de prise journalière	Principaux effets secondaires	Principaux éléments à surveiller
Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI)				
RETROVIR® 8 €	AZT (Zidovudine) Gélule 100/250mg Comprimé 300 mg Solution buvable 100mg/10ml Fl. pour perfusion 200mg/ml	1-0-1, Soit 500 à 600 mg/j Sans contrainte alimentaire. Association au D4T non recommandée	Anélie, Leucopénie, Neutropénie Céphalées, nausées Myalgies Cardiomyopathie Acidose lactique avec stéatose hépatique	NFS CPK
ZERIT® 7,50 €	D4T (Stavudine) Gélule 20, 30, 40mg Poudre buvable 1mg/ml	1-0-1 Sans contrainte alimentaire. soit : - 80 mg/j (si > 60 kg) - 60 mg/j (si < 60 kg) Association à l'AZT et au DDI non recommandée	Neuropathie périphérique dose-dépendante Pancréatite Lipoatrophie Acidose lactique avec stéatose hépatique	Signes de neuropathie périphérique Lipasémie Bilan hépatique NFS
EPIVIR® 6 €	3TC (Lamivudine) Comprimé 150, 300 mg Solution buvable 10mg/ml	300 mg/j en monoprise. Sans contrainte alimentaire.	N.B : molécule relativement bien tolérée Pancréatite Acidose lactique	Lipasémie Bilan hépatique
VIDEX® 4,50 € à 7 €	DDI (Didanosine) Gélule 125, 200, 250, 400 mg Poudre buvable 2 et 4 g/flacon	Mono ou biprise : 400 mg/jour (si > 60 kg) 250 mg/jour (si < 60 kg) Association au TDF non recommandée (- efficacité virologique) A jeun < ou 2 h > repas	Pancréatite Neuropathie périphérique Troubles digestifs Acidose lactique avec stéatose hépatique Lipoatrophie	Signes de neuropathie périphérique Lipasémie Bilan hépatique NFS
KIVEXA® 15,80 €	ABC + 3TC Comprimé 600/ 300 mg	1 cp/j, Sans contrainte alimentaire. Test HLA B5701 (cf. ci- dessous)	<i>Cf. ZIAGEN / EPIVIR</i>	<i>Cf. ZIAGEN / EPIVIR</i>
EMTRIVA® 6 €	FTC (Emtricitabine) Gélule 200 mg Solution buvable 10 mg/mL	1 gélule/jour Sans contrainte alimentaire.	Céphalées, vertiges Troubles digestifs Eruption, prurit Acidose lactique Lipoatrophie	Glycémie, Bilan hépatique Bilan lipidique Lipasémie Créatinémie et clairance
COMBIVIR® 13,20 €	AZT + 3TC Comprimé 300/ 150 mg	1-0-1, Sans contrainte alimentaire.	<i>Cf. RETROVIR / EPIVIR</i>	<i>Cf. RETROVIR / EPIVIR</i>

SPECIALITE Coût / Jour	Molécule Présentations	Modalités de prise journalière	Principaux effets secondaires	Principaux éléments à surveiller
ZIAGEN® 10,30 €	ABC (Abacavir) Comprimé 300 mg Solution buvable 20mg/ml	Mono ou biprise : 2 cp/j, soit 600mg/jour. Sans contrainte alimentaire. Association au TDF non recommandée (- efficacité virologique)	Réactions pluri- symptomatiques d'hypersensibilité avec ou sans rash cutané: fièvre, troubles digestifs, respiratoires, musculaires, articulaires. Céphalées. Acidose lactique avec stéatose hépatique Lipoatrophie	HLA B5701 : contreindication Ne pas réintroduire si suspicion d'hypersensibilité Bilan hépatique NFS
TRIZIVIR® 21,70 €	AZT + 3TC + ABC Comprimé 300/ 150/ 300 mg	1-0-1, Sans contrainte alimentaire. Test HLA B5701 (cf. ci-dessus)	<i>Cf. RETROVIR / EPIVIR / ZIAGEN</i>	<i>Cf. RETROVIR / EPIVIR / ZIAGEN</i>
Association INTI + INNTI				
ATRIPLA® 25 €	EFV + TDF + FTC Comprimé 600/ 300/ 200 mg	0-0-1 Au coucher (à jeun).	<i>Cf. SUSTIVA / TRUVADA</i>	<i>Cf. SUSTIVA / TRUVADA</i>
Inhibiteurs d'entrée				
FUZEON® 56 €	T20 (Enfuvirtide) Poudre injectable sous-cutanée 90mg/ml	1-0-1 en SC, à 12H d'intervalles	Erythème et/ou nodule au point d'injection Survenue d'infections bactériennes	NFS Bilan hépatique
CELESENTRI® 26 €	Maraviroc Comprimé 150, 300mg	1-0-1 (150 mg) si IP/r (sauf TPV, FPV) 2-0-2 :300 mg si EFV sans IP 1-0-1 :300 mg si autres ARV Sans contrainte alimentaire.	Troubles digestifs Céphalées Diminution de la réponse immunitaire à certaines infections	NFS Bilan hépatique
Inhibiteurs d'intégrase : anti-intégrases				
ISENTRESS® 30 €	Raltégravir Comprimé 400 mg	1-0-1 Sans contrainte alimentaire.	Vertiges Troubles digestifs Hyperhidrose Arthralgies Myopathie et Rhabdomyolyse	Bilan hépatique CPK