



Modalités de prise :

Vous allez prendre ... comprimés de **NORVIR®**,
Ils doivent être pris pendant les repas



Les comprimés doivent être avalés entiers avec un grand verre d'eau, il ne faut pas les couper, les écraser ou les mâcher.

Votre traitement ne doit jamais être arrêté, au risque d'entraîner des infections potentiellement graves, ainsi que des résistances du virus.



En cas d'oubli: Si vous avez oublié de prendre votre traitement depuis moins de 4h, vous pouvez prendre le ou les comprimé(s) oublié(s). Si cela fait plus de 4h, attendre la prochaine prise. Ne jamais doubler la dose.



Adaptation posologique/ Interactions médicamenteuses :

Attention: NORVIR® peut être à l'origine d'interactions médicamenteuses: des adaptations de posologies sont parfois nécessaires, et certains médicaments sont interdits.

→ **Avant de prendre tout autre médicament, demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.**
Attention ne pas associer à des préparations à base de millepertuis.
Eviter en général les gélules à base de plantes.



Effets indésirables possibles :

- Perturbation des bilans hématologique et hépatique
- Réaction allergique (rougeurs, gonflement du visage, démangeaisons)
- Altération du goût, céphalées, sensation de picotement ou d'engourdissement au niveau des mains, des pieds, et/ou autour de la bouche
- Douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhées
- Douleurs musculaires, fatigue

Certains effets indésirables peuvent s'atténuer avec le temps :
parlez en avec votre médecin ou à votre pharmacien.



Prévenez votre médecin

- Devant des douleurs, des engourdissements, des sensations de brûlures au niveau des pieds et des mains
→ Possible neuropathie périphérique
- Si vous ressentez des douleurs articulaires et des difficultés à vous mouvoir :
→ Ces effets peuvent être le début de troubles osseux.

- Devant des nausées importantes, des vomissements ou des douleurs abdominales
→ Possible pancréatite

NORVIR® ne guérit pas de l'infection par le VIH ni du sida.

Sous ce traitement, le risque de transmission du virus VIH par contacts sexuels ou par contamination sanguine persiste.

Les précautions adaptées doivent être prises.

Ce document a été réalisé par des pharmaciens et des médecins du CHU de Clermont-Ferrand. Il répond à l'obligation d'information des patients (art. L5126-5 et R 5015-48 du Code de la Santé Publique) et ne cherche pas à remplacer les documents officiels pouvant être fournis par les laboratoires

Rétrocessions Service Pharmacie - Pr. Chopineau - Hôpital Gabriel Montpied -
CHU Clermont-Ferrand
Téléphones : 04 73 75 17 68 (préparateurs) ou 04 73 75 17 67 (pharmaciens)



Vous prenez un traitement appelé **NORVIR®**
Il est composé d'une molécule : le **ritonavir**
Ce médicament est indiqué dans le traitement de
l'infection par le VIH



Conservation à température
ambiante, à l'abri de
l'humidité

