



## **Modalités de prise :**



Vous allez prendre ... comprimés de **SUSTIVA®**, .....

Il est recommandé de prendre les comprimés à jeun, préférentiellement au coucher pour diminuer les effets indésirables neurologiques.

Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau.

**Votre traitement ne doit jamais être arrêté, au risque d'entraîner des infections potentiellement graves, ainsi que des résistances du virus.**



En cas d'oubli: Prenez la dose oubliée le plus rapidement possible, mais ne doublez jamais la dose suivante.



## **Adaptation posologique/ Interactions médicamenteuses :**

**Attention:** SUSTIVA® peut être à l'origine d'interactions médicamenteuses: des adaptations de posologies sont parfois nécessaires, et certains médicaments sont interdits:

**Avant de prendre tout autre médicament, demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.**  
Attention ne pas associer à des préparations à base de millepertuis.  
Eviter en général les gélules à base de plantes.



## **Effets indésirables possibles :**

- Rêves anormaux, dépression, anxiété, insomnie, vertiges, maux de tête  
→ ces effets disparaissent en général au bout de 2 à 3 semaines de traitement
- Douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhées
- Eruptions cutanées, démangeaisons
- Fatigue
- Troubles hépatiques
- Modification de la répartition des graisses (lipodystrophie)

Certains effets indésirables peuvent être traités ou s'atténuer avec le temps : parlez-en à votre médecin et à votre pharmacien.



## Prévenez votre médecin

- Si une éruption cutanée avec vésicules, fièvre, malaise, grande fatigue, rougeur des yeux apparaissent  
→ ce peut être une réaction allergique
- Si vous ressentez une raideur des articulations, des difficultés à vous mouvoir  
→ ce peut être le signe de troubles osseux

**SUSTIVA® ne guérit pas de l'infection par le VIH ni du sida.**

**Sous ce traitement, le risque de transmission du virus VIH par contacts sexuels ou par contamination sanguine persiste.**

**Les précautions adaptées doivent être prises.**

*Ce document a été réalisé par des pharmaciens et des médecins du CHU de Clermont-Ferrand. Il répond à l'obligation d'information des patients (art. L5126-5 et R 5015-48 du Code de la Santé Publique) et ne cherche pas à remplacer les documents officiels pouvant être fournis par les laboratoires*

Rétrocessions Service Pharmacie - Pr. Chopineau - Hôpital Gabriel Montpied -  
CHU Clermont-Ferrand  
Téléphones : 04 73 75 17 68 (préparateurs) ou 04 73 75 17 67 (pharmaciens)



Vous prenez un traitement appelé **SUSTIVA®**  
Il est composé d'une molécule : l'efavirenz.  
Ce médicament est indiqué dans le traitement de  
l'infection par le VIH



Conservation à température  
ambiante, à l'abri de  
l'humidité