



## **Modalités de prise :**

Vous allez prendre ... comprimés de **TELZIR®**, .....  
Ils peuvent être pris pendant ou en dehors des repas.



Les comprimés doivent être avalés entiers avec un grand verre d'eau.

**Votre traitement ne doit jamais être arrêté, au risque d'entraîner des infections potentiellement graves, ainsi que des résistances du virus.**



En cas d'oubli: Prenez la dose oubliée le plus tôt possible, mais ne doublez jamais la dose suivante.



## **Adaptation posologique/ Interactions médicamenteuses :**

**Attention:** Telzir® peut être à l'origine d'interactions médicamenteuses: des adaptations de posologies sont parfois nécessaires, et certains médicaments sont interdits:

→ Avant de prendre tout autre médicament, demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Attention ne pas associer à des préparations à base de millepertuis



## **Effets indésirables possibles :**

- Diarrhées, nausées, vomissements, douleurs abdominales
- Augmentation du taux de graisses dans le sang
- Eruption cutanée
- Maux de tête, fatigue
- Troubles hépatiques
- Fourmillements ou engourdissement au niveau des lèvres ou de la bouche
- Modification de la répartition des graisses (lipodystrophies)

Certains effets indésirables peuvent s'atténuer avec le temps :  
parlez en avec votre médecin ou à votre pharmacien.



## Prévenez votre médecin

- Devant une éruption cutanée : celle-ci peut s'aggraver.
- Une raideur au niveau des articulations, des douleurs, des difficultés pour exécuter certains mouvements.  
→ ce peut être le signe d'atteintes osseuses

**TELZIR® ne guérit pas de l'infection par le VIH ni du sida.  
Sous ce traitement, le risque de transmission du virus VIH par  
contacts sexuels ou par contamination sanguine persiste.  
Les précautions adaptées doivent être prises**

*Ce document a été réalisé par des pharmaciens et des médecins du CHU de Clermont-Ferrand . Il répond à l'obligation d'information des patients (art. L5126-5 et R 5015-48 du Code de la Santé Publique) et ne cherche pas à remplacer les documents officiels pouvant être fournis par les laboratoires*

Rétrocessions Service Pharmacie - Pr. Chopineau - Hôpital Gabriel Montpied -  
CHU Clermont-Ferrand  
Téléphones : 04 73 75 17 68 (préparateurs) ou 04 73 75 17 67 (pharmaciens)



Vous prenez un traitement appelé **TELZIR®**  
Il est composé d'une molécule : le fosamprénavir.  
Ce médicament est indiqué dans le traitement de  
l'infection par le VIH



Conservation à température  
ambiante, à l'abri de  
l'humidité