



## **Modalités de prise :**

Vous allez prendre ... comprimés de TRIZIVIR ®, .....  
Ils peuvent être pris pendant ou en dehors des repas. Les prises doivent être espacées de 12h environ.



Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau, il ne faut pas les écraser ou les croquer.

**Votre traitement ne doit jamais être arrêté, au risque d'entraîner des infections potentiellement graves, ainsi que des résistances du virus.**



En cas d'oubli: Si vous avez oublié de prendre votre traitement depuis moins de 4h, vous pouvez prendre le ou les gélule(s) oubliée(s). Si cela fait plus de 4h, attendre la prochaine prise.  
Ne jamais doubler la dose.



## **Adaptation posologique/ Interactions médicamenteuses :**

**Attention:** des adaptations de posologies sont parfois nécessaires avec TRIZIVIR®.

→ **Avant de prendre tout autre médicament, demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.**  
Attention ne pas associer à des préparations à base de millepertuis.  
Eviter en général les gélules à base de plantes.



## **Effets indésirables possibles :**

- Anomalies du bilan hématologique
- Anomalies du bilan biochimique (augmentation des graisses et des sucres dans le sang)
- Insomnie, rêves anormaux
- Diarrhées, nausées, vomissements, anorexie, perte de poids
- Maux de tête, fatigue, vertiges
- Eruption cutanée
- Douleurs et faiblesse musculaire
- Modification de la répartition des graisses (lipodystrophies)

Certains effets indésirables peuvent s'atténuer avec le temps :  
parlez en avec votre médecin ou à votre pharmacien.



## Prévenez votre médecin

- Si vous présentez une éruption cutanée, ou des symptômes tels qu'une fièvre, un essoufflement, des maux de gorge, des nausées, vomissements ou douleurs abdominales, ainsi qu'une sensation de malaise général : ce peut être une réaction allergique, due à l'abacavir,
- Raideur, douleur et endolorissement d'articulations et difficultés à se déplacer  
→ Signes d'une atteinte osseuse
- Une douleur musculaire inexplicquée, une sensibilité ou une faiblesse musculaire
- Jaunissement de la peau et du blanc des yeux, urines foncées, selles décolorées, fatigue → atteinte hépatique
- Soif, émission fréquente d'urine, vision trouble ou perte de poids  
→ Augmentation du taux de sucre dans le sang : risque de diabète
- Nausées, vomissements, maux de ventre  
→ Augmentation des corps gras dans le sang

**TRIZIVIR® ne guérit pas de l'infection par le VIH ni du sida.**

**Sous ce traitement, le risque de transmission du virus VIH par contacts sexuels ou par contamination sanguine persiste.**

**Les précautions adaptées doivent être prises.**

*Ce document a été réalisé par des médecins et des pharmaciens du CHU de Clermont-Ferrand . Il répond à l'obligation d'information des patients (art. L5126-5 et R 5015-48 du Code de la Santé Publique) et ne cherche pas à remplacer les documents officiels pouvant être fournis par les laboratoires*

Rétrocessions Service Pharmacie - Pr. Chopineau - Hôpital Gabriel Montpied - CHU Clermont-Ferrand  
Téléphones : 04 73 75 17 68 (préparateurs) ou 04 73 75 17 67 (pharmaciens)



Vous prenez un traitement appelé **TRIZIVIR®**

Il est composé de 3 molécules :

**l'abacavir, le zidovudine et la lamivudine.**

Ce médicament est indiqué dans le traitement de l'infection par le VIH



Conservation à température ambiante, à l'abri de l'humidité