



Modalités de prise :

Vous allez prendre ... comprimés de **TRUVADA®**,
Il doivent être pris pendant les repas.



Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau,
Si vous avez des difficultés pour avaler, vous pouvez dissoudre le comprimé dans un demi-verre d'eau, de jus d'orange ou de jus de raisin.

Votre traitement ne doit jamais être arrêté, au risque d'entraîner des infections potentiellement graves, ainsi que des résistances du virus.



En cas d'oubli: Si vous avez oublié de prendre votre traitement depuis moins de 6h, vous pouvez prendre le ou les gélule(s) oubliée(s).
Si cela fait plus de 6h, attendre la prochaine prise.
Ne jamais doubler la dose.



Adaptation posologique/ Interactions médicamenteuses :

Attention: des adaptations de posologies sont parfois nécessaires avec VIREAD®, en particulier lors d'atteinte rénale.

Le ténofovir, une des molécules contenue dans ATRIPLA®, est toxique pour le rein : il faut donc éviter les médicaments tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui peuvent léser vos reins.

Exemples : → Ibuprofène (ADVIL®, NUREFLEX®, NUROFEN®...)

→ Diclofenac (VOLTARENE®, FLECTOR®...)

→ Kétoprofène (BI-PROFENID®, KETUM®...)

→ **Avant de prendre tout autre médicament, demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.**
Attention ne pas associer à des préparations à base de millepertuis.
Eviter en général les gélules à base de plantes.



Effets indésirables possibles :

- Insuffisance rénale
- Fatigue, insomnie
- Perturbation biologique avec augmentation des sucres et des graisses dans le sang
- Modification de la répartition des graisses (lipodystrophies)



Prévenez votre médecin

- Si vous ressentez des difficultés respiratoires, une somnolence, des nausées, des vomissements
→ ce peut être le début d'une acidose lactique.
- Si vous ressentez des douleurs articulaires et des difficultés à vous mouvoir : → ces effets peuvent être le début de troubles osseux.

**TRUVADA® ne guérit pas de l'infection par le VIH
ni du SIDA.**

**Sous ce traitement, le risque de transmission du virus VIH par
contacts sexuels ou par contamination sanguine persiste.**

Les précautions adaptées doivent être prises.

Ce document a été réalisé par des pharmaciens et des médecins du CHU de Clermont-Ferrand. Il répond à l'obligation d'information des patients (art. L5126-5 et R 5015-48 du Code de la Santé Publique) et ne cherche pas à remplacer les documents officiels pouvant être fournis par les laboratoires

Rétrocessions Service Pharmacie - Pr. Chopineau - Hôpital Gabriel Montpied -
CHU Clermont-Ferrand
Téléphones : 04 73 75 17 68 (préparateurs) ou 04 73 75 17 67 (pharmaciens)



Vous prenez un traitement appelé **TRUVADA®**
Il est composé de 2 molécules : **l'emtricitabine
et le ténofovir.**

Ce médicament est indiqué dans le traitement de
l'infection par le VIH



Conservation à température
ambiante, à l'abri de
l'humidité