



Modalités de prise :

Vous allez prendre ... gélules de **VIDEX®**,
Elles doivent être prises à jeun, 2h avant ou après les repas.



Les gélules doivent être avalées entières avec un grand verre d'eau,
Elles ne doivent pas être ouvertes. Eviter de les prendre avec des
boissons acides tels que coca ou jus d'orange.

**Votre traitement ne doit jamais être arrêté, au risque
d'entraîner des infections potentiellement graves, ainsi que des
résistances du virus.**



En cas d'oubli: Si vous avez oublié de prendre votre traitement
depuis moins de 4h, vous pouvez prendre le ou les comprimé(s)
oublié(s). Si cela fait plus de 4h, attendre la prochaine prise.
Ne jamais doubler la dose.



Adaptation posologique/ Interactions médicamenteuses :

Attention: VIDEX® peut être à l'origine d'interactions médicamenteuses: des
adaptations de posologies sont parfois nécessaires, et certains médicaments
sont interdits:

→ Avant de prendre tout autre médicament, demander conseil à votre
pharmacien ou à votre médecin.

Attention ne pas associer à des préparations à base de millepertuis



Effets indésirables possibles :

- Nausées, vomissements, diarrhées
- Neuropathies, maux de tête, fatigue
- Eruptions cutanées, troubles oculaires
- Perturbations des bilans biologiques (biochimique et
hématologique)
- Modification de la répartition des graisses
(lipodystrophies)

Certains effets indésirables peuvent s'atténuer avec le temps :
parlez en avec votre médecin ou à votre pharmacien.



Prévenez votre médecin

- Si vous ressentez des engourdissements, des fourmillements, et des douleurs dans les bras et dans les jambes
→ ce peut être le début d'une neuropathie périphérique.
- Si vous ressentez des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales importantes
→ ce peut être le début d'une acidose lactique, ou une pancréatite.
- Si vous ressentez des douleurs articulaires et des difficultés à vous mouvoir : → ces effets peuvent être le début de troubles osseux.

VIDEX® ne guérit pas de l'infection par le VIH ni du sida.

Sous ce traitement, le risque de transmission du virus VIH par contacts sexuels ou par contamination sanguine persiste.

Les précautions adaptées doivent être prises.

Ce document a été réalisé par des pharmaciens et des médecins du CHU de Clermont-Ferrand . Il répond à l'obligation d'information des patients (art. L5126-5 et R 5015-48 du Code de la Santé Publique) et ne cherche pas à remplacer les documents officiels pouvant être fournis par les laboratoires

Rétrocessions Service Pharmacie - Pr. Chopineau - Hôpital Gabriel Montpied -
CHU Clermont-Ferrand
Téléphones : 04 73 75 17 68 (préparateurs) ou 04 73 75 17 67 (pharmaciens)



Vous prenez un traitement appelé **VIDEX®**
Il est composé d'une molécule : **la didanosine.**
Ce médicament est indiqué dans le traitement de
l'infection par le VIH

Conservation à température
ambiante, à l'abri de
l'humidité