



## **Modalités de prise :**

Vous allez prendre ... comprimés de **VIRAMUNE®**, .....  
Ils peuvent être pris pendant ou en dehors des repas.



Les comprimés doivent être avalés entiers avec un grand verre d'eau, il ne faut pas les écraser, les couper ou les croquer.

**Votre traitement ne doit jamais être arrêté, au risque d'entraîner des infections potentiellement graves, ainsi que des résistances du virus.**



En cas d'oubli: Si vous vous apercevez de votre oubli dans les 8h, prenez la dose oubliée dès que possible. Si votre oubli date de plus de 8h, prenez la dose suivante à l'heure habituelle.  
Ne doublez jamais la dose.



## **Adaptation posologique/ Interactions médicamenteuses :**

**Attention:** Viramune® peut être à l'origine d'interactions médicamenteuses: des adaptations de posologies sont parfois nécessaires, et certains médicaments sont interdits:

→ Avant de prendre tout autre médicament, demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Attention ne pas associer à des préparations à base de millepertuis



## **Effets indésirables possibles :**

- Troubles hépatiques
- Eruption cutanée
- Réaction allergique
- Nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales
- Douleurs musculaires
- Troubles hématologiques
- Fatigue, maux de tête
- Modification de la répartition des graisses (lipodystrophies)

Certains effets indésirables peuvent s'atténuer avec le temps :  
parlez en avec votre médecin ou à votre pharmacien.



## Prévenez votre médecin

- Devant des difficultés à respirer, un gonflement du visage, associés à une éruption cutanée, des plaies dans la bouche, une sensation de malaise  
→ ces symptômes peuvent être le signe d'une réaction allergique
- Devant une éruption cutanée seule : elle survient généralement dans les 6 premières semaines de traitement, et peut s'aggraver.
- Devant une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, une coloration jaune de la peau et des douleurs abdominales  
→ ces symptômes peuvent être les signes d'une atteinte hépatique

**VIRAMUNE® ne guérit pas de l'infection par le VIH  
ni du SIDA.**

**Sous ce traitement, le risque de transmission du virus VIH par  
contacts sexuels ou par contamination sanguine persiste.**

**Les précautions adaptées doivent être prises.**

*Ce document a été réalisé par des pharmaciens et des médecins du CHU de Clermont-Ferrand. Il répond à l'obligation d'information des patients (art. L5126-5 et R 5015-48 du Code de la Santé Publique) et ne cherche pas à remplacer les documents officiels pouvant être fournis par les laboratoires*

Rétrocessions Service Pharmacie - Pr. Chopineau - Hôpital Gabriel Montpied -  
CHU Clermont-Ferrand  
Téléphones : 04 73 75 17 68 (préparateurs) ou 04 73 75 17 67 (pharmaciens)



Vous prenez un traitement appelé **VIRAMUNE®**  
Il est composé d'une molécule : la **névirapine**.  
Ce médicament est indiqué dans le traitement de  
l'infection par le VIH

