



Modalités de prise :

Vous allez prendre ... comprimés de **ZIAGEN®**,
Ils peuvent être pris pendant ou en dehors des repas.



Les comprimés doivent être avalés entiers avec un grand verre d'eau, mais ils peuvent également être écrasés et mélangés à de la nourriture.

Votre traitement ne doit jamais être arrêté, au risque d'entraîner des infections potentiellement graves, ainsi que des résistances du virus.



En cas d'oubli: Si vous vous apercevez de votre oubli dans les 4h, prenez la dose oubliée dès que possible. Si votre oubli date de plus de 4h, prenez la dose suivante à l'heure habituelle.
Ne doublez jamais la dose.



Adaptation posologique/ Interactions médicamenteuses :

Attention: Ziagen® peut être à l'origine d'interactions médicamenteuses: des adaptations de posologies sont parfois nécessaires, et certains médicaments sont interdits:

→ Avant de prendre tout autre médicament, demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Attention ne pas associer à des préparations à base de millepertuis



Effets indésirables possibles :

- Réaction allergique (fièvre, éruption cutanée, troubles respiratoires, sensation de malaise)
- Nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales
- Maux de tête, fatigue
- Perte d'appétit
- Modification de la répartition des graisses (lipodystrophies)

Certains effets indésirables peuvent s'atténuer avec le temps :
parlez en avec votre médecin ou à votre pharmacien.



Prévenez votre médecin

- Une sensation de malaise, des troubles respiratoires, une éruption cutanée, un gonflement soudain du visage
→ Ce peut être une réaction allergique
- Devant une faiblesse inhabituelle, une perte d'appétit, si vous avez des urines foncées et des selles décolorées
→ Ce peut être le début de troubles hépatiques
- Douleurs et raideurs articulaires
→ Ce peut être les signes d'une atteinte osseuse

**ZIAGEN® ne guérit pas de l'infection par le VIH
ni du SIDA.**

**Sous ce traitement, le risque de transmission du virus VIH par
contacts sexuels ou par contamination sanguine persiste.**

Les précautions adaptées doivent être prises.

Ce document a été réalisé par des pharmaciens et des médecins du CHU de Clermont-Ferrand . Il répond à l'obligation d'information des patients (art. L5126-5 et R 5015-48 du Code de la Santé Publique) et ne cherche pas à remplacer les documents officiels pouvant être fournis par les laboratoires

Rétrocessions Service Pharmacie - Pr. Chopineau - Hôpital Gabriel Montpied -
CHU Clermont-Ferrand
Téléphones : 04 73 75 17 68 (préparateurs) ou 04 73 75 17 67 (pharmaciens)



Vous prenez un traitement appelé **ZIAGEN®**
Il est composé d'une molécule : l'**abacavir**.
Ce médicament est indiqué dans le traitement de
l'infection par le VIH



Conservation à température
ambiante, à l'abri de
l'humidité